

АНТИБИОТИКИ

Амоксициллин 500мг (антибиотик шир.спект.действ.): заболевания дыхательных путей, гайморите, синусите, фарингите, тонзиллите, отит, болезни ЖКТ, желчного пузыря и печени, инфекции кожи, мягких тканей и костей, заболевания мочеполовой системы, эндокардит, бактериемия, ОРВИ и ОРЗ, осложненные бактериальной инфекцией, менингит, пахименингит, эпидурит, лептоспироз, сепсис, боррелиоз.

Принимать необходимо примерно в одно и то же время между приемами пищи. Лечение необходимо продолжать в течение в течение 2–3 дней после исчезновения симптоматики.

Принимать по **500 мг препарата трижды в сутки минимум 5**, макс. 12 дней. *Если пропущен прием необходимо как можно быстрее принять 1 дозу не дожидаясь времени следующего приема. Двойную дозу принимать не следует. Далее принимать с восьмичасовыми промежутками между приемом (при трехразовой кратности приема) или с двенадцатичасовыми (при двухразовой).*

Доксициклин 100мг (антибактериальное, бактериостатическое): Антибиотик широкого спектра действия из группы тетрациклинов. Применять при сепсисе, инф. дых. путей, при отите, синусите и тп, инф. перед. ПП., инф. ЖКТ, ин.ф кожи и мягких тканей, лихорадке, после укуса животных, ин. заболевания глаз, профилактика после операций и малярии. Принимать: Принимать сидя или стоя во время еды растворив в небольшом количестве воды (около 20 мл) или проглотить целиком, разделить на части или разжевать, запивая водой. Обычно продолжительность лечения составляет 5-10 дней. **в первый день лечения назначают 200 мг/сут в 1 или 2 приема, в последующие дни лечения - по 100 мг/сут в 1 прием.** В случае тяжелых инфекций назначают по 200 мг/сут в течение всего периода лечения.

Для профилактики диареи путешественников - 200 мг в первый день поездки в 1 или 2 приема, далее - по 100 мг 1 раз/сут в течение всего пребывания в регионе (не более 3 недель).

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ

Солпадеин 500мг (обезболик): Анальгетик-антипиретик: головная боль, мигрень, зубная боль, боль в пояснице, невралгия, мышечная и ревматическая боль, боли в горле. Принимать по **1 таблетке до 3 раз в сутки через 4 часа.**

Дротаверин 40мг (спазмолитическое средство): боли в животе, головная боль напряжения, метеоризм, гастрит, энтерит, цистит. Принимать по **1-2 таблетки 2-3 раза в сутки (макс сут доза 240мг).**

Кеторолак 10мг: сильный обезболик! Поможет при: травмах, сильной зубной боли, вывихах, растяжения, ревматизме, боли в мышцах, связках, сухожилиях и фасциях, боли в суставах, травмах нерва (невралгия),
Принимать: внутрь, однократно или повторно в зависимости от тяжести болевого синдрома. **Разовая доза – 10 мг** (1 таб.), **при повторном приеме рекомендуется принимать по 10 мг до 4-х раз в сутки** в зависимости от выраженности боли. Максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг. Продолжительность курса не должна превышать 5 дней. *Для снижения риска развития нежелательных явлений следует применять минимальную эффективную дозу кеторолака минимально возможным коротким курсом. После приема внутрь начало обезболивающего действия отмечается через 1 час, максимальный эффект через 1-2 часа.*

АНТИБИОТИКИ

Амоксициллин 500мг (антибиотик шир.спект.действ.): заболевания дыхательных путей, гайморите, синусите, фарингите, тонзиллите, отит, болезни ЖКТ, желчного пузыря и печени, инфекции кожи, мягких тканей и костей, заболевания мочеполовой системы, эндокардит, бактериемия, ОРВИ и ОРЗ, осложненные бактериальной инфекцией, менингит, пахименингит, эпидурит, лептоспироз, сепсис, боррелиоз.

Принимать необходимо примерно в одно и то же время между приемами пищи. Лечение необходимо продолжать в течение в течение 2–3 дней после исчезновения симптоматики.

Принимать по **500 мг препарата трижды в сутки минимум 5**, макс. 12 дней. *Если пропущен прием необходимо как можно быстрее принять 1 дозу не дожидаясь времени следующего приема. Двойную дозу принимать не следует. Далее принимать с восьмичасовыми промежутками между приемом (при трехразовой кратности приема) или с двенадцатичасовыми (при двухразовой).*

Доксициклин 100мг (антибактериальное, бактериостатическое): Антибиотик широкого спектра действия из группы тетрациклинов. Применять при сепсисе, инф. дых. путей, при отите, синусите и тп, инф. перед. ПП., инф. ЖКТ, ин.ф кожи и мягких тканей, лихорадке, после укуса животных, ин. заболевания глаз, профилактика после операций и малярии. Принимать: Принимать сидя или стоя во время еды растворив в небольшом количестве воды (около 20 мл) или проглотить целиком, разделить на части или разжевать, запивая водой. Обычно продолжительность лечения составляет 5-10 дней. **в первый день лечения назначают 200 мг/сут в 1 или 2 приема, в последующие дни лечения - по 100 мг/сут в 1 прием.** В случае тяжелых инфекций назначают по 200 мг/сут в течение всего периода лечения.

Для профилактики диареи путешественников - 200 мг в первый день поездки в 1 или 2 приема, далее - по 100 мг 1 раз/сут в течение всего пребывания в регионе (не более 3 недель).

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ

Солпадеин 500мг (обезболик): Анальгетик-антипиретик: головная боль, мигрень, зубная боль, боль в пояснице, невралгия, мышечная и ревматическая боль, боли в горле. Принимать по **1 таблетке до 3 раз в сутки через 4 часа.**

Дротаверин 40мг (спазмолитическое средство): боли в животе, головная боль напряжения, метеоризм, гастрит, энтерит, цистит. Принимать по **1-2 таблетки 2-3 раза в сутки (макс сут доза 240мг).**

Кеторолак 10мг: сильный обезболик! Поможет при: травмах, сильной зубной боли, вывихах, растяжения, ревматизме, боли в мышцах, связках, сухожилиях и фасциях, боли в суставах, травмах нерва (невралгия),
Принимать: внутрь, однократно или повторно в зависимости от тяжести болевого синдрома. **Разовая доза – 10 мг** (1 таб.), **при повторном приеме рекомендуется принимать по 10 мг до 4-х раз в сутки** в зависимости от выраженности боли. Максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг. Продолжительность курса не должна превышать 5 дней. *Для снижения риска развития нежелательных явлений следует применять минимальную эффективную дозу кеторолака минимально возможным коротким курсом. После приема внутрь начало обезболивающего действия отмечается через 1 час, максимальный эффект через 1-2 часа.*

ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ

Парацетмол 500мг - при температуре, легкой/средней зубной/головной боли, при коронавирусе, при простуде — как жаропонижающее и обезболивающее, при ОРВИ, от давления, от мигрени, при похмелье. Снимает отечность.

Принимать внутрь, запивая необходимым количеством воды **по 2-4 таб. в день через 4 часа**, длительность терапии — 3–7 дней, в зависимости от показаний: до 4 г в сутки, по 500 мг за один прием.

ПРИ РАССТРОЙСТВЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Лоперамид таб 2 мг: Симптоматическая терапия хронической и острой диареи, которая обусловлена изменением качественного состава пищи и режима питания; при диарее инфекционного происхождения, как вспомогательное средство. Принимать: Внутрь, НЕ РАЗЖЕВЫВАЯ, запивая водой. Острая диарея, взрослым: **4 мг (2 капс) – начальная доза, далее после каждого акта дефекации по 2 мг, 16 мг – максимальная суточная доза. При отсутствии стула более 12 часов или нормализации консистенции кала терапию необходимо прекратить.**

Панкреатин либо Пензитал - Улучшает функциональное состояние ЖКТ, нормализует процессы пищеварения. Помогает при метеоризме, диарее неинфекционного генеза, нарушение усвоения пищи, для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании. *Пензитал* принимать внутрь **по 1–2 таблетке 3 раза в сутки**, во время или после еды, не разжевывая и *запивая только водой. Панкреатин* по 2–4 таблетки 3–6 раз в сутки.

ОБРАБОТКА РАН, ОЖОГОВ

Синтомициновая эмульсия: антибиотик широкого спектра действия. Поможет при ожогах, язвах, ранах (без гноя и некроты). Применение: наносят **непосредственно на раневую поверхность**, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или линимент синтомицина наносят на перевязочный материал, а затем на рану.

ПРИ КАШЛЕ

Амброксол: отхаркивающее средство при мокром кашле.

Принимать внутрь после еды с достаточным количеством жидкости по **1 таблетка 30 мг 3 раза в сутки** в течение первых 2-3 дней, затем дозу препарата необходимо уменьшить **до 1 таблетки 2 раза в сутки**.

ПРИ АЛЛЕРГИИ

Лоратадин противоаллергическое средство: Противоаллергический эффект развивается через 30 мин, достигает максимума через 8-12 ч и длится 24 ч. Принимать по **1 таблетке 1 раз в день**.

ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ

Парацетмол 500мг - при температуре, легкой/средней зубной/головной боли, при коронавирусе, при простуде — как жаропонижающее и обезболивающее, при ОРВИ, от давления, от мигрени, при похмелье. Снимает отечность.

Принимать внутрь, запивая необходимым количеством воды **по 2-4 таб. в день через 4 часа**, длительность терапии — 3–7 дней, в зависимости от показаний: до 4 г в сутки, по 500 мг за один прием.

ПРИ РАССТРОЙСТВЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Лоперамид таб 2 мг: Симптоматическая терапия хронической и острой диареи, которая обусловлена изменением качественного состава пищи и режима питания; при диарее инфекционного происхождения, как вспомогательное средство. Принимать: Внутрь, НЕ РАЗЖЕВЫВАЯ, запивая водой. Острая диарея, взрослым: **4 мг (2 капс) – начальная доза, далее после каждого акта дефекации по 2 мг, 16 мг – максимальная суточная доза. При отсутствии стула более 12 часов или нормализации консистенции кала терапию необходимо прекратить.**

Панкреатин либо Пензитал - Улучшает функциональное состояние ЖКТ, нормализует процессы пищеварения. Помогает при метеоризме, диарее неинфекционного генеза, нарушение усвоения пищи, для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании. *Пензитал* принимать внутрь **по 1–2 таблетке 3 раза в сутки**, во время или после еды, не разжевывая и *запивая только водой. Панкреатин* по 2–4 таблетки 3–6 раз в сутки.

ОБРАБОТКА РАН, ОЖОГОВ

Синтомициновая эмульсия: антибиотик широкого спектра действия. Поможет при ожогах, язвах, ранах (без гноя и некроты). Применение: наносят **непосредственно на раневую поверхность**, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или линимент синтомицина наносят на перевязочный материал, а затем на рану.

ПРИ КАШЛЕ

Амброксол: отхаркивающее средство при мокром кашле.

Принимать внутрь после еды с достаточным количеством жидкости по **1 таблетка 30 мг 3 раза в сутки** в течение первых 2-3 дней, затем дозу препарата необходимо уменьшить **до 1 таблетки 2 раза в сутки**.

ПРИ АЛЛЕРГИИ

Лоратадин противоаллергическое средство: Противоаллергический эффект развивается через 30 мин, достигает максимума через 8-12 ч и длится 24 ч. Принимать по **1 таблетке 1 раз в день**.